



Prairie de pente

Pascal POULIQUEN a gagné le concours à deux reprises et dans les deux catégories: fauche (et pâturage) et pâturage exclusif. Ses prairies sont peu humides et sur sol pauvre, mais abritent une diversité végétale très intéressantes. Son système d'exploitation est dit extensif du fait de ses pratiques (absence de fertilisation, autonomie fourragère...). Les prairies permanentes sont la base principale du fourrage du troupeau.

En bref

Elevage en bovin viande.
Certification biologique.
0,85 UGB/ha : 30 vaches allaitantes et 30 à 40 mâles/génisses.
Total des surfaces fourragères 64 ha dont 62 ha de prairies permanentes.
Rendement fourrager: 3,5 à 4 T/ha.

Le troupeau

La génétique est un croisement limousine, normande et armoricaine.

Pascal n'utilise pas de complément alimentaire pour gérer la transition alimentaire entre le foin et l'herbe. Le ratio entre cette alimentation est doucement modulé.

Les pratiques

Déprimage : se fait en février si la quantité en herbe est suffisante.

Fauche : la date de fauche est déterminée en fonction de l'herbe. Le pâturage qui s'en suit va durer de 15 jours à 3 semaines. 3 ou 4 passages sont réalisés dans l'année.

Pâturage : 6 passages/an pendant une durée de 4 jours réalisés par 10 vaches suitées.

Période de repousse : de 1 à 1,5 mois.

Fertilisation : aucune fertilisation n'est réalisée.

PARTICIPATION AU CONCOURS DES PRAIRIES FLEURIES	Année	2014	2015	
	Prix	1 ^{er} prix	1 ^{er} prix	
	Catégorie	Fauche (et pâturage)	Pâturage	
	Nombre d'espèces végétales présentes	Entre 50 à 70	22	
	Parcelles lauréates	Surface	2 ha	1 ha
		Distance (au siège de l'exploitation)	2 km	3 km
Altitude		120 m	120 m	

Conduite tournante fil avant-arrière

Les bovins ne restent pas longtemps sur de petites parcelles pour limiter les dégâts sur celle-ci. Les ruminants sortent une fois que la prairie est rase, ce qui permet de limiter les refus.

Les pratiques en détails

Le déprimage permet de retarder la fauche et de booster la végétation.

La fauche a lieu lorsqu'un maximum de végétation est en fleur pour ainsi assurer un bon rendement. La grande richesse floristique lui permet d'avoir une souplesse d'exploitation et ainsi pouvoir faucher de juin à septembre.

Le pâturage doit être fait à ras, limitant les refus et laissant entrer la lumière, ce qui favorise la pousse de légumineuses.

Le déprimage en action:



Zoom

Comment limiter l'embroussaillage tout en réensemencant ses prairies?

Si la broussaille commence à être trop présente (fougère et ronce notamment) le broyeur est passé sur ces zones qui sont généralement localisées et des ballots de foin sont disposés dessus en hiver. Le piétinement affaiblit les plants, la présence de graines d'intérêt présentes dans le fourrage permet de réensemencer les prairies et les bêtes ont de quoi manger en hiver.