




Légende
FUSION_totale_22juin2015
Diminutif

- Renouées
- Buddléia
- Herbe de la pampa
- Rhododendron pontique
- Laurier Palme
- Jussies
- Berce du Caucase
- Impatience de l'Himalaya
- Sénéçon du Cap

PLAN DE GESTION DIRINON

Station: 1

Espèce: Renouée du Japon

Lieu dit : Vervian Vraz

Emprise: longueur 10 mètres, largeur 4 mètres, superficie 40 m²

Structure du sol: remblais, terre de curage

Cycle végétal: plante ayant fleuri

Zones en contact: haie saule-noisetier, champs de maïs

Dynamique : relativement stable

Gestion antérieure: épareuse

Préconisations: purge de la station et du substrat (3 remorquée de 8 m³)

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : Moyen



Station: 2

Espèce: Balsamine de l'Himalaya

Lieu dit : Penn ar Lann

Emprise: 100 mètres de longueur

Structure du sol: Talus et fossé

Cycle végétal: Floraison et graine

Zones en contact: Haie arbustive et végétation du fossé, route

Dynamique : en progression

Gestion antérieure: arrachage

Préconisations : Passage annuel et arrachage avant la floraison

Niveau de priorité d'intervention : Fort

Niveau d'intervention : Faible mais régulier



Station: 3

Espèce: Renouée du Japon + haie de laurier + tritonia crocosmia.

Lieu dit : Poulescadec

Emprise: superficie 50 m2.

Structure du sol: sur remblais et dépôts de cailloux instables.

Cycle végétal: plante ayant fleuri

Zones en contact: haie chêne-noisetier, dépôt de déchet verts, cultures.

Dynamique : stable

Gestion antérieure: voisin qui passe la tondeuse.

Préconisations: ne rien faire

Niveau de priorité d'intervention : Faible

Niveau d'intervention : important



Station: 4

Espèce: Renouée du Japon

Lieu dit : Toulhoat

Emprise: longueur 25 mètres sur les deux talus, limitée par la compétition avec le roncier

Structure du sol: talus non plantés

Cycle végétal: plante ayant fleuri

Zones en contact: échappée du jardin, champs de maïs

Gestion antérieure: épareuse, traitement chimique herbicide par l'agriculteur.

Préconisations: proscrire épareuse, proscrire curage, laisser la compétition végétale s'installer.

Niveau de priorité d'intervention : Faible

Niveau d'intervention : important



Station: 5

Espèce: Renouée du Japon

Lieu dit : L'Isle

Emprise: longueur: 15 mètres en discontinu, superficie: tâche de 10 m2 limitée par un roncier

Structure du sol: le long d'un ruisseau pentu et sur talus, sur remblais et dépôt de déchets verts

Cycle végétal: plante ayant fleuri.

Zones en contact: talus, ruisseau, prairie.

Gestion antérieure:

Préconisations: laisser la compétition végétale s'installer afin d'assurer une couverture végétale

Niveau de priorité d'intervention : Fort

Niveau d'intervention : important



Station: 6

Espèces: Renouée du Japon surtout, buddléia, herbe de la pampa, laurier.

Lieu dit : Dirinon

Emprise: stations importantes en zone humide possiblement liée à une zone de dépôt technique

Structure du sol: zone humide

Cycle végétal: plante ayant fleuri

Zones en contact: chemin de terre, bois humides, zone humides, haie et talus

Gestion antérieure: barre de coupe par un agriculteur

Préconisations: Restauration zone humide
proscrire épareuse, travaux en zone humide pour buddléia, herbe de la pampa
renouée, et laurier palme

Niveau de priorité d'intervention : Fort

Niveau d'intervention : important



Station: 7

Espèces: Laurier palme.

Lieu dit : Bourg

Emprise: répartition clairsemée tout le long de la portion de route, en sous-bois du fait de la dissémination par les oiseaux sans doute.

Structure du sol: humus de sous-bois.

Cycle végétal: plante ayant fleuri

Zones en contact: sous-bois, jardin, zones fleuries communales, passage, bord de route.

Gestion antérieure : travaux à la mini-pelle sur la partie publique.

Préconisations: éviter la venue en graines des semenciers par une taille par élagage.
Avertir et sensibiliser le propriétaire privé.

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : Moyen



Station: 8

Espèces: Renouée du Japon et renouée de l'Himalaya

Lieu dit : Rest Guéron

Emprise: stations importantes et possiblement liées à une zone de dépôt technique

Structure du sol: talus, fossé, bord de route

Cycle végétal: canne sèche, première plantule

Zones en contact: routes, voie de chemin de fer, zone humide, champs, zone de dépôt

Gestion antérieure : épareuse en bord de route

Préconisations: proscrire l'épareuse dans les zones où cela est possible, sinon précaution d'usage.

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : important



Station: 9

Espèces: Laurier palme

Lieu dit : Ty croas

Emprise : un plant et une haie de semenciers.

Structure du sol: talus, bord de terrain de sport.

Cycle végétal: en floraison.

Zones en contact: bassin de rétention d'eau, terrain de sport, jardin de particuliers, zone boisée.

Gestion antérieure : élagage ?

Préconisations: taille et élagage pour éviter la venue en graine.

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : Moyen



Station: 11

Espèces: Jussie

Lieu dit : Kéroncuff

Emprise: plusieurs zones de la mare occupées, chez un privé.

Structure du sol: eau, bord de mare

Cycle végétal:

Zones en contact: zone humide, bords de mare.

Gestion antérieure : aucune ?

Préconisations: retrait et exportation hors de la mare

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : important



Station: 12 point a

Espèces: Renouée du Japon

Lieu dit : Ilbrat

Emprise: 25m de long sur 5m de large, 125 m²

Structure du sol: talus, fossé, bord de route, champs cultivé.

Cycle végétal: plante ayant fleuri.

Zones en contact: routes, champs, fossé. C'est une zone très complexe.

Gestion antérieure: épaveuse en bord de route, travail de la terre agricole.

Préconisations: proscrire l'épaveuse lorsque cela est possible, éviter de travailler la zone du champs ?
précautions extrêmes lors du curage du fossé.

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : Faible



Station: 12 point b

Espèces: Renouée du Japon

Lieu dit : Ilbrat

Emprise: quelques plants dans les fossés et sur les talus.

Structure du sol: talus, faussée, bord de route, champs.

Cycle végétal: plante ayant fleuri.

Zones en contact: routes, champs, bois, fossé

Gestion antérieure : épareuse en bord de route

Préconisations: proscrire l'épareuse lorsque cela est possible, retrait des plants car peu nombreux ?

Niveau de priorité d'intervention : Fort

Niveau d'intervention : Moyen



Station: 12 point c

Espèces: Renouée du Japon

Lieu dit : Ilbrat

Emprise: sur 30m le long du talus et quelques plants sur le terre-plein.

Structure du sol: talus, fossé, bord de route, champs, terre-plein.

Cycle végétal: plante ayant fleuri.

Zones en contact: route, champs.

Dynamique : forte, colonisation du champs.

Gestion antérieure : fauche sur le terre-plein, débroussaillage sur le talus ?

Préconisations: proscrire la fauche, retrait des plants car peu nombreux sur la pelouse du terre-plein ?
favoriser la compétition sur le talus ?

Niveau de priorité d'intervention : Fort

Niveau d'intervention : important



Station: 13

Espèces: Herbe de la pampa

Lieu dit : Kéramborn

Emprise: tout du long du talus le long de la voie express, foncier compliqué : commune, état, privé.

Structure du sol: talus, carrière, zone de travaux.

Cycle végétal: plantes avec les plumeaux, sujet plus ou moins jeunes.

Zones en contact: routes, carrière, zone de travaux, remblai, zones de dépôts

Gestion antérieure: ?

Préconisations: Arrachage

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : Important



Station: 14

Espèces: laurier + renouée

Lieu dit : kerpierre

Emprise:

Structure du sol:

Cycle végétal: graines

Zones en contact:

Gestion antérieure: élagage en bordure

Préconisations: arrachage

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen

Station: 15

Espèces: laurier et rhododendron

Lieu dit : lesquivit

Emprise: plusieurs semenciers dans le bois chez un privé

Structure du sol: humus de sous-bois, sol en bordure de prairie.

Cycle végétal: venue en graine pour les semenciers.

Zones en contact: sous-bois, prairie.

Gestion antérieure : aucun, élagage pour ceux en bordure de champ

Préconisations: abattre les semenciers.

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen



Station: 16

Espèces: jussie, et myriophylle, renouée du japon.

Lieu dit : arboretum

Emprise: la jussie semble peu présente, la myriophylle a envahi une partie d'une mare et on retrouve quelques spécimens dans les autres mares.

Structure du sol: eau, berge

Cycle végétal:

Zones en contact: berge

Dynamique : forte, la profondeur d'eau est elle un facteur limitant ?

Gestion antérieure : retrait de la jussie et dépôt à la déchetterie.

Préconisations: retrait et exportation des végétaux ?

Niveau de priorité d'intervention : fort

Niveau d'intervention : important



Station: 17

Espèce: Balsamine de l'Himalaya

Lieu dit : Dirinon

Emprise: faible, quelques plants

Structure du sol: fossé

Cycle végétal: plante ayant fleuri

Zones en contact: talus, route

Dynamique : à évaluer

Gestion antérieure: aucune

Préconisations: arrachage avant floraison régulièrement pendant plusieurs années

Niveau de priorité d'intervention : fort

Niveau d'intervention : faible

Station: 19

Espèce: Renouée du Japon

Lieu dit : arboretum

Emprise: ?

Structure du sol:

Cycle végétal: plante ayant fleurie

Zones en contact: eau, berge

Dynamique : ?

Gestion antérieure : ?

Préconisations: pas de fauche

Niveau de priorité d'intervention : fort

Niveau d'intervention : moyen

Station: 20

Espèces: Herbe de la pampa

Lieu dit : Poulescadec

Emprise: pelouse d'un particulier.

Structure du sol: pelouse

Cycle végétal: plantes avec les plumeaux, sujet plus ou moins jeunes.

Zones en contact:

Gestion antérieure: non

Préconisations: Arrachage, couper les plumeaux

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : Important

Station: 21

Espèce: Renouée du Japon

Lieu dit : coat mez

Emprise: longueur de 30 mètres

Structure du sol:

Cycle végétal: plante ayant fleurie

Zones en contact: route, champs

Dynamique : ?

Gestion antérieure : fauche, débroussaillage

Préconisations: pas de fauche, purge, compétition

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen