

## PLAN DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

COMMUNE DE SAINT URBAIN – NOVEMBRE 2019

Ce plan de gestion concerne les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes :

- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)
- Balsamine de l'Himalaya (*Impatiens glandulifera*)

Il localise également les plantes suivantes :

- Herbe de la Pampa

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation de Renouée du Japon ou Balsamine de l'Himalaya (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

### ▣ Niveau de priorité :

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches

### ▣ Niveau d'intervention :

Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques

## 1 : Localisation des stations

### cf cartes suivantes


Les stations de Renouées du Japon se trouvent à Penhep (1 et 2), à la Zone de Dépôt de Balanec (3), au croisement de la direction Kerzulec.

La station de Balsamine de l'Himalaya se trouve en contre-bas de la station d'épuration dans le fossé droit, le ruisseau proche faisant la frontière avec Dirinon.











## 2 : Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

### ► Secteur Penhep

#### Station 1

**Espèce** : Renouée du Japon

**Surface** : 15 m<sup>2</sup>

**Hauteur** : 2 m

**Cycle** : floraison

**Contacts** : chemin, champs, talus, haie,

**Type de gestion** : aucune

**Niveau priorité** : moyen

**Préconisations** : Favoriser la concurrence végétale

**Niveau d'intervention** : faible

**Remarque** : Informer les agriculteurs





## Station 2

**Espèce** : Renouée du Japon

**Surface** : 30 m<sup>2</sup>

**Hauteur** : 2 m

**Cycle** : floraison

**Contacts** : talus, fossé, accotement, champs

**Type de gestion** : Epareuse en marge, coupe manuelle

**Niveau priorité** : moyen

**Préconisations** : pas de broyage, coupe manuelle laissée sur place

**Niveau d'intervention** : faible

**Remarque** : Informer agriculteurs





## ► Secteur de Balanec

### Station 3

**Espèce** : Renouée du Japon

**Surface** : 5 m<sup>2</sup>

**Hauteur** : 2,5 m

**Cycle** : floraison

**Contacts** : Zone stockage, broussailles, graviers

**Type de gestion** : aucune

**Niveau priorité** : moyen

**Préconisations** : favoriser la concurrence végétale, précautions lors des déplacements de coupes, pas de broyage.

**Niveau d'intervention** : faible

**Remarque** : réaménagement prévu lié aux réseaux ?





► Secteur Ty Guen au croisement avec la rue de Kastel Dour

Station 4

**Espèce** : Renouée du Japon

**Surface** : 4 m<sup>2</sup>

**Hauteur** : 1,5 m

**Cycle** : floraison

**Contacts** : haie, fossé, jardin, accotement

**Type de gestion** : entretien fossé, entretien haie par le particulier

**Niveau priorité** : fort

**Préconisations** : Informer particulier, précautions lors du curage fossé, concurrence végétale

**Niveau d'intervention** : faible

**Remarque** : Informer particulier, dissémination possible lors de l'entretien du fossé





### 3 : Balsamine de l'Himalaya (*Impatiens glandulifera*)

#### Station 5

**Espèce** : Balsamine de l'Himalaya

**Surface** : 2 m<sup>2</sup>

**Hauteur** : 1 m

**Cycle** : graines

**Contacts** : chemin, fossé, ruisseau

**Type de gestion** : arrachage avant floraison ?

**Niveau priorité** : fort

**Préconisations** : arrachage avant floraison, mise en sac poubelle pour incinération

**Niveau d'intervention** : faible

**Remarque** : vigilance curage fossé



#### 4 : Synthèse

| N° station | Espèce                  | Situation / lieu-dit        | Priorité d'intervention | Niveau d'intervention |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1          | Renouée du Japon        | Penhep                      | moyen                   | faible                |
| 2          | Renouée du Japon        | Penhep                      | fort                    | faible                |
| 3          | Renouée du Japon        | Balanec                     | faible                  | faible                |
| 4          | Renouée du Japon        | Ty Guen                     | fort                    | faible                |
| 5          | Balsamine de l'Himalaya | Ruisselet Station épuration | fort                    | faible                |
|            |                         |                             |                         |                       |
|            |                         |                             |                         |                       |